

The background of the slide is a photograph of a farm. On the left, a black and white cow is in a stall, wearing a yellow tag with the number "17". In the center and right, two men are looking at something in their hands, possibly a piece of hay or a sample. The scene is lit with warm, indoor lighting.

SANO KONCEPT VÝŽIVY SKOT

Dojnice

VÍTEJTE

Vážený zákazníku,

vážený zájemce o naše výrobky,

jsme velmi rádi, že vás zaujal Sano koncept výživy dojnic.

Na následujících stránkách najdete důležité informace na téma výživa

- dojnic v období stání nasucho
- dojnic v období laktace
- zástavového skotu v období odchovu

Odpovědi na Vaše otázky Vám rádi poskytneme na telefonním čísle +420 379 713 111 nebo e-mailem na adrese sano@sano.cz.

Dojnice v období stání nasucho

DOJNICE V OBDOBÍ STÁNÍ NASUCHO



Informace o fázi užítkovosti: dojnice v období stání nasucho

Prvním dnem nové laktace je první den fáze stání nasucho a ne první den po otelení. Toto tvrzení jasně vysvětluje význam fáze stání nasucho v chovu dojnic. V období stání nasucho jsou položeny základy pro zdravotní stav, plodnost a mléčnou užítkovost dojnic v laktaci. V této fázi intenzivně roste a vyvíjí se nejen plod, ale také děloha, placenta a plodová voda. Mléčná žláza se začíná připravovat na další laktaci.

Výživa v období stání nasucho výrazně ovlivňuje také výskyt metabolických onemocnění, jako například mléčná horečka nebo ketóza. V moderních chovech dojnic jsou dojnice krmeny každý den všemi složkami výživy. Díky tomu nedochází ke změnám krmiv a bachor může kdykoliv po celý rok podávat 100% výkon. Krmit každý den všechny složky výživy znamená: krávy dostávají i v období stání nasucho všechny složky výživy z krmné směsi pro období laktace. To pozitivně působí na reprodukci a mléčnou užítkovost a zároveň to potlačuje výskyt mléčné horečky.

DOJNICE V OBDOBÍ STÁNÍ NASUCHO



Sano koncept výživy je zaměřený na speciální cíle ve fázi stání nasucho:

- optimální příprava na laktaci
- vysoká užitkovost v období laktace
- prevence mléčné horečky a zadržetí lůžka
- udržení kondice dojnic

V případě, že Vás tento koncept zaujal, kontaktujte ještě dnes svého Sano odborného poradce pro výživu.

Na Vaše další otázky Vám rádi odpovíme telefonicky na čísle +420 379 713 111 nebo e-mailem na adrese sano@sano.cz.

Laktace

LAKTACE



Informace o fázi užitkovosti: laktace

V období laktace je, zejména při vysoké mléčné užitkovosti, mimořádně důležité, aby dojnice přijímaly velké množství živin a dokázaly tyto živiny optimálně využít, pro vysokou mléčnou užitkovost, vysoký obsah mléčných složek, dobrou plodnost a dobrý zdravotní stav. Základem pro to je právě správná výživa už v období stání nasucho podle Sano konceptu výživy pro dojnice ve fázi stání nasucho. Krmit všechny komponenty každý den znamená udržení výkonu bachoru stále na úrovni 100%.

Proto musí krmivo pro dojnice v období laktace splňovat určitá kritéria:

- Objemné krmivo musí být vysoce kvalitní. Vyvarujte se ztrát živin a druhotné fermentaci. Před silážováním proto ošetřete objemné krmivo přípravkem **Labacsil Duo®**.
- Používejte jen vysoce kvalitní složky, protože každá složka v krmivu, která nezvyšuje jeho výživovou hodnotu, stojí peníze. Naopak každá složka, která zvyšuje jeho výživovou hodnotu, přináší peníze.
- Krmivo musí dobře vonět a chutnat, aby ho dojnice na začátku laktace přijímaly v dostatečném množství (nejméně 22 kg sušiny).
- Krmivo nesmí být ani příliš vlhké, ani příliš suché. Nejvyššího příjmu krmiva dosáhnete tehdy, když je obsah sušiny TMR 42 až 50 %.
- Vodu a krmivo nabídněte zvířatům volně k dispozici.

LAKTACE



Informace o fázi užítkovosti: laktace

- Zamíchejte všechny složky, které budete zkrmovat, do krmné dávky tak, aby si dojnice nemohly vybírat.
- Krmnou dávku sestavte co nejjednodušší. Tak předejdete případným chybám.
- Složení krmné dávky musí odpovídat požadavkům přežvýkavců (dojnice v období laktace: ca. 55 přežvýknutí/sousto).
- Složky krmné dávky musí být k dispozici po celý rok.
- Živiny v krmivu musí být navzájem sladěné. To znamená: poměr mezi energií a ostatními živinami musí být odpovídající.
- Pomocí mírného nadbytku proteinů v krmné dávce, zejména v poslední třetině laktace, snížíte nebezpečí nárůstu tuku a podpoříte tělesnou kondici (pozorujte výkaly).
- Krmivo musí stimulovat látkovou výměnu zvířat a vracet jim minerální látky, stopové prvky a vitamíny, které zvíře „ztratilo“ při tvorbě mléka.

LAKTACE



Sano koncept výživy je zaměřený na speciální cíle užitkovosti v období laktace:

- vysoká produkce mléka
- Vysoký obsah bílkovin a tuku v mléce
- vysoká kvalita mléka
- zdravé tele každý rok
- zdravé a výkonné vemeno
- zdravé a stabilní paznehty
- vysoká celoživotní užitkovost (více než 35 000 kg mléka)
- nízké výrobní náklady na produkci jednoho litru mléka

V případě, že Vás tento koncept zaujal, kontaktujte ještě dnes svého Sano odborného poradce pro výživu.

Na Vaše další otázky Vám rádi odpovíme telefonicky na čísle +420 379 713 111 nebo e-mailem na adrese sano@sano.cz.

Odchov zástavového skotu

ODCHOV ZÁSTAVOVÉHO SKOTU



Informace o období života: odchov zástavového skotu – od odstavení od mléka až do 12. měsíce života

Fáze1:

První fáze odchovu je pro telata intenzivní. Musí být dosaženo denních přírůstků ca. 850 g, aby bylo možné jalovičky připustit ve věku 15 až 17 měsíců a s hmotností nad 400 kg. Mimořádně důležitý je dobrý tělesný vývoj a vývoj vemena. Základ vemena se tvoří mezi 3. a 9. měsícem života. Intenzivní výživa v tomto období podpoří optimální růst a vývoj vemena. Pokud je krmivo zadržováno, ukládá se tuk do tkání vemena. To vede ke snížení mléčné užitkovosti. Všechny chyby v prvním roce odchovu jdou na vrub celoživotní užitkovosti. Krmivo pro odchov zástavového skotu musí dobře vonět a chutnat. Mělo by být nejlepší kvality a mělo by obsahovat hodně vysoce stravitelných komponentů. Také voda musí být volně k dispozici v nejlepší kvalitě a dostatečném množství. Zástavový skot s hmotností 150 - 450 kg vypije denně 10 až 45 litrů vody. To, jestli se zvířata vyvíjejí „podle plánu“, můžete jednoduše zjistit změřením obvodu hrudníku a výšky v kohoutku. Kontrola by se měla provádět pravidelně, s malými odstupy, aby bylo možné co nejrychleji zareagovat na případnou chybu v krmení.

ODCHOV ZÁSTAVOVÉHO SKOTU



Informace o období života: odchov zástavového skotu – od 13. měsíce života do otelení (přibližně 24. měsíc života)

Fáze 2:

Ve druhé fázi odchovu musí jalovice zpomalit. Požadovány jsou denní přírůstky ca. 750 g, aby jalovice při prvním otelení ve věku 24 až 26 měsíců měly hmotnost převyšující 600 kg. Od inseminace až do ca. čtyř týdnů před otelením je potřeba krmnou dávku správně vybalancovat, aby zvířata měla dostatek živin, ale nedocházelo k jejich zatloustnutí – dostávají tedy krmnou dávku pro dojnice ve fázi stání nasucho. Příliš intenzivně krmená zvířata by ztučněla a byla by náchylná k problémům při porodu, poruchám metabolismu na začátku laktace a k poruchám reprodukce. Zvířata, jejichž hmotnost je v době otelení nižší než 600 kg, mají horší produkci mléka. Všechny chyby, ke kterým dojde ve druhé fázi odchovu jdou na vrub užítivosti – denní objem mléka, plodnost.

ODCHOV ZÁSTAVOVÉHO SKOTU



Sano koncept výživy zvířat je zaměřený na speciální cíle užitečnosti ve fázi odchovu zástavového skotu:

- vysoké denní přírůstky
- včasné první otelení
- zdravé a výkonné vemeno
- silná a stabilní kostra a zdravé paznehty
- vysoká produkce mléka
- dlouhověká užitečnost
- nízké náklady na odchov

V případě, že Vás tento koncept zaujal, kontaktujte ještě dnes svého Sano odborného poradce pro výživu.

Na Vaše další otázky Vám rádi odpovíme telefonicky na čísle +420 379 713 111 nebo e-mailem na adrese sano@sano.cz.



Děkujeme za Váš zájem o Sano koncept výživy pro dojnice.

Na vaše otázky Vám rádi kdykoliv odpovíme na telefonním čísle +420 379 713 111 nebo e-mailem na adrese sano@sano.cz

Sano