

The Sano logo is positioned in the top right corner of the page. It consists of the word "Sano" in a bold, yellow, sans-serif font. The background of the entire page is a photograph of three people shaking hands in front of a building with a window. A semi-transparent yellow rectangle is overlaid on the center of the image, containing the main title and subtitle.

**Sano**

The main title is centered within a semi-transparent yellow rectangular overlay. It is written in a bold, white, sans-serif font. The background of the slide is a photograph of three people shaking hands in front of a building with a window. A semi-transparent yellow rectangle is overlaid on the center of the image, containing the main title and subtitle.

**SANO  
KONCEPT VÝŽIVY  
PRASAT**

The subtitle is located in the bottom left corner of the semi-transparent yellow overlay. It is written in a white, sans-serif font. The background of the slide is a photograph of three people shaking hands in front of a building with a window. A semi-transparent yellow rectangle is overlaid on the center of the image, containing the main title and subtitle.

**Výkrm prasat**

# VÍTEJTE

Vážený zákazníku,

vážený zájemce o naše výrobky,

jsme velmi rádi, že vás Sano koncept výživy prasat ve výkrmu zaujal.

Na následujících stránkách najdete důležité informace o výživě prasat

- na začátku výkrmu
- na konci výkrmu

Odpovědi na Vaše otázky Vám rádi poskytneme na telefonním čísle +420 379 713 111 nebo e-mailem na adrese [sano@sano.cz](mailto:sano@sano.cz).

**Začátek výkrmu**

# ZAČÁTEK VÝKRMU



## Informace o období života: začátek výkrmu

Při krmení dodržujte zejména následující body:

- Je-li to možné, naplánujte plynulý přechod ze startéru pro selata krmivo pro prasata ve výkrmu.
- V prvních dnech krmete pouze dobře stravitelné krmivo jako je obilí, kukuřice a sójový šrot. Teprve po dvou týdnech přejděte na další složky a vedlejší produkty. Z bílkovinných krmiv vykazuje nejvyšší stravitelnost proteinů sójový šrot s 85%. Tato hodnota je případě ostatních bílkovinných nosičů jako je řepkový šrot, bob, hrách a slunečnicový šrot, výrazně nižší.
- Na začátku výkrmu dbejte také na nízkou vazebnou kapacitu kyselin krmiva a jako doplněk použijte **SanoCid®**, kyselinu mravenčí ve formě prášku. Tímto způsobem podpoříte trávení prasat v předvýkrmu, snížíte výskyt onemocnění spojených s příjmem krmiva a zvýšíte užitkovost.

Po fázi ustájení získá na významu užitkovost Vašich zvířat: Protože vysoké denní přírůstky v počátku výkrmu zlepšují tvorbu svaloviny a využití krmiva, krmete Vaše zvířata až do hmotnosti ca. 70 kg ad libitum.

Pro zvýšení tvorby svaloviny musí krmivo pro začátek výkrmu obsahovat v dostatečném množství všechny důležité aminokyseliny potřebné pro syntézu bílkovin.

# ZAČÁTEK VÝKRMU



## Informace o období života: začátek výkrmu

Současně musí být obsah bílkovin v krmivu co nejnižší, protože zvíře musí při odbourávání přebytečných bílkovin vynaložit velké množství energie. To má negativní vliv na denní přírůstky a využití krmiva. Tyto předpoklady splníte pomocí účinné látky **SanAmin**<sup>®</sup>, která se nachází v produktech **Aminogold Forte**<sup>®</sup> a **Mastino**<sup>®</sup>. **SanAmin**<sup>®</sup> podporuje tvorbu svaloviny i při nižším obsahu bílkovin v krmivu. Současně se zvyšuje užítkovost Vašich zvířat a vy šetříte náklady na krmivo.

Obzvláště u technologií na tekuté krmení dbejte na nejvyšší hygienické standardy.

Abyste vedle čištění ještě dodatečně podpořili hygienu technologií na tekuté krmení a současně s tím podpořili také užítkovost Vašich zvířat, použijte **Mastino**<sup>®</sup>.

Ve stájích, provozovaných systémem „all in – all out“ použijte **Mastino**<sup>®</sup> na začátku každého turnusu, po období alespoň 4 týdnů.

Jsou-li stáje kontinuálně obsazeny, zamíchejte **Mastino**<sup>®</sup> do krmiva 3 x ročně minimálně po dobu 4 týdnů.

Speciálně pro technologie tekutého krmení obsahuje **Mastino**<sup>®</sup> také ještě speciální probiotikum s trojnásobným účinkem:

1. Osazení Vašeho zařízení pro mokré krmení prospěšnými zárodky
2. Užítkovost zvyšující, probiotický účinněk na zvířata
3. Snížení vylučování dusíku

# ZAČÁTEK VÝKRMU



## Informace o období života: začátek výkrmu

Protože jsou na krmivo pro Vaše prasata ve výkrmu kladeny vysoké nároky, přidejte do krmiva až do hmotnosti ca. 70 kg 3 % **Aminogold® Forte** a 0,5 % **SanoCid®** nebo, pokud krmíte tekutým krmivem, 3 % **Mastino®** (při 88 % sušiny).

Tím:

- zabezpečíte vysoký příjem krmiva, protože krmivo dobře voní a chutná
- poskytnete Vaším zvířatům všechny důležité živiny a účinné látky pro rovnoměrný a rychlý růst
- snížíte vazebnou kapacitu kyselin v krmivu pro začátek výkrmu
- předejdete poruchám trávení
- zvýšíte tvorbu a ukládání svaloviny
- zabezpečíte vysoké denní přírůstky a optimální využití krmiva.

### **Aminogold® Forte**, resp. **Mastino®**

- zabezpečují vysoký příjem krmiva
- optimalizují trávení
- zlepšují využití krmiva
- zlepšují odolnost
- podporují rovnoměrný růst
- zvyšují tvorbu a ukládání svaloviny

Podpořte dodatečně v prvních 2 týdnech po naskladnění, zejména při ne zcela optimálních podmínkách (nákup z více podniků, velké množství choroboplodných zárodků apod.), odolnost Vašich prasat přidáním 0,5 % produktu **StabiloSan®** do krmiva.

# ZAČÁTEK VÝKRMU



## Sano koncept výživy zvířat je zaměřený na speciální cíle užitkovosti v začátku výkrmu:

- nízké ztráty v týdnu naskladnění
- intenzivní tvorba a ukládání svaloviny
- vysoké denní přírůstky (> 750 g)
- dobré využití krmiva (< 2,9:1)
- vysoký podíl libového masa (> 58 %)

V případě zájmu kontaktujte ještě dnes svého Sano odborného poradce.

Pro Vaše případné další otázky jsme Vám k dispozici a rádi Vám odpovíme na telefonním čísle +420 379 713 111 nebo e-mailem na adrese [sano@sano.cz](mailto:sano@sano.cz).

# Konec výkrmu



# KONEC VÝKRMU



## Informace o období života: konec výkrmu

Přírůstek živé hmotnosti prasete ve výkrmu je od hmotnosti ca. 70 kg jiný než na začátku výkrmu. Na začátku výkrmu bylo ukládání proteinů ještě velmi vysoké, a proto krmivo obsahovalo více proteinů resp. aminokyselin, na podporu tvorby a ukládání svaloviny. Od hmotnosti ca. 70 kg klesá schopnost prasat ukládat proteiny, ale zvyšuje se ukládání tuku. To znamená, že krmivo pro konec může obsahovat méně proteinů (při optimální skladbě aminokyselin).

Navíc to má ještě jeden pozitivní efekt, s močůvkou je vylučováno méně dusíku (N).

V krmivu pro konec výkrmu lze také snížit obsah fosforu. Také toto opatření má pozitivní vliv na vlastnosti kejdy.

Čím méně dusíku a fosforu Vaše zvířata vylučují, tím více zvířat / hektar můžete chovat.

Abyste vyhověli těmto požadavkům, měli byste svá prasata ve výkrmu krmit ve fázích, které se orientují podle toho, jaká je potřeba v jednotlivých obdobích.

V krmivu pro prasata na konci výkrmu by se měl proto snížit obsah fosforu a hrubé proteinu.

Snížení obsahu proteinů je však možné pouze tehdy, pokud se do krmiva přidávají všechny ostatní chybějící esenciální aminokyseliny v izolované a vysoce stravitelné formě (**SanAmin®**). Takto se optimálním způsobem doplní sójové proteiny pro vysoké denní přírůstky a optimální tvorbu a ukládání svaloviny.

# KONEC VÝKRMU



## Informace o období života: konec výkrmu

Fázový výkrm pro Vás má tyto výhody:

- metabolismus Vašich zvířat je šetřen, což zlepší jejich užitkovost
- v provozu se zlepší se vlastnosti kejdy a tím lze vylepšit maximální počet zvířat chovaných na hektar, protože se vylučuje méně dusíku a fosforu
- snížení nákladů na krmiva díky snížení obsahu složek obsahujících minerální látky a bílkoviny (sója) a díky lepšímu využití krmiva

V každém případě si zajistěte optimální termín porážky, pro lepší jatečnou výtěžnost.

Také stupeň rozemletí krmiva má vliv na užitkovost. Je-li krmivo příliš hrubé, snižují se denní přírůstky a zhoršuje se využití krmiva. Je-li naopak příliš jemné, dochází k výskytu žaludečních vředů. Dbejte proto na to, aby podíl jemných částic (< 1 mm) v krmivu nepřesahoval 40 %. Pomocí separátorů pravidelně kontrolujte stupeň rozemletí krmiva. Je-li obsah jemných částic v krmivu příliš vysoký, překontrolujte kladívka ve šrotovníku, zda nejsou opotřebovaná. Doporučená velikost ok síta je 3,5 až 4,0 mm.

# KONEC VÝKRMU



## Informace o období života: konec výkrmu

Protože jsou na krmivo pro Vaše prasata ve výkrmu kladeny vysoké nároky, přidávejte jim od ca. 70 kg do krmiva 2,5 % **Aminogold® Forte**..

### Tím:

- zmírníte zátěž metabolismu Vašich zvířat a zlepšíte jejich zdraví
- zvýšíte možný počet zvířat / hektar
- ušetříte drahý sójový šrot
- podpoříte vysoký podíl libového masa
- postaráte se o vysoké denní přírůstky a optimální využití

**Aminogold® Forte** obsahuje **San Amin®** pro optimalizaci kvality bílkovin. Díky tomu je možné snížit celkový obsah bílkovin v krmivu (sójový šrot). Tím a díky vysoce kvalitním zdrojům minerálních látek a fytázy v produktu **Aminogold® Forte**, je možné zlepšit vlastnosti kejdy a ulehčit metabolismu zvířat.

Účinná látka ButySanProtect v produktu **Aminogold® Forte** zlepšuje trávení, zdravotní stav střev a využití krmiva.

Na ochranu vitamínu E, zvýšení antioxidantní kapacity a také odolnosti obsahuje **Aminogold® Forte** Sano-Polyfenolkomplex.

# KONEC VÝKRMU



## Informace o období života: konec výkrmu

### Aminogold® Forte

- zabezpečuje vysoký příjem krmiva
- optimalizuje trávení
- zlepšuje využití krmiva
- zlepšuje obranyschopnost
- podporuje rovnoměrný růst
- pro vysoký podíl libového masa

## Sano koncept výživy je zaměřený na speciální cíle užitečnosti na konci výkrmu:

- nejlepší využití krmiva
- vysoký podíl libového masa
- mnoho turnusů/rok

V případě zájmu kontaktujte ještě dnes svého Sano odborného poradce.

Pro Vaše případné další otázky jsme Vám k dispozici a rádi Vám odpovíme na telefonním čísle +420 379 713 111 nebo e-mailem na adrese [sano@sano.cz](mailto:sano@sano.cz).



**Děkujeme za Váš zájem o Sano koncept výživy prasat ve výkrmu.**

Na Vaše otázky Vám rádi kdykoliv odpovíme na telefonním čísle +420 379 713 111 nebo e-mailem na adrese [sano@sano.cz](mailto:sano@sano.cz).

**Sano**